

กินปลาน้ำจืดดิบ ติดพยาธิ เป็นมะเร็งท่อน้ำดีตาย

สถิติอันน่าตกใจเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต จากโรคมะเร็งท่อน้ำดีและโรคพยาธิใบไม้ตับ

คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตจาก

มะเร็งท่อน้ำดี 20,000 คน/ปี

เปรียบเทียบกับ เครื่องบินตกเท่ากับปีละ 100 ลำ

ตัวเลขสูงมาก!



มีผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับเสียชีวิตทุกครึ่งชั่วโมง !!!

- ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอันดับ 1
- มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงประมาณปีละ 6 ล้านคน
- ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงอายุ 40-60 ปี

วงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และการแพร่กระจาย



อาการเบื้องต้น ของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อแข็งที่ท่อน้ำดี ที่อยู่ในตับหรือท่อน้ำดี ซึ่งจะมีอาการต่างตามระดับความรุนแรงและส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอาการเฉพาะโรค

ไม่ให้เห็นก้อนเนื้อ
มีอาการบวมใหม่
มากกว่าร้อยละ 50

เบื่ออาหาร ดาหาไม่ย่อย น้ำหนักลดลงมาก ผอมลง

มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ตาเหลือง ตัวเหลือง

ปวดท้องได้
ฉายโครงขาว
ข้าวไปหลังหรือท้อง

คันตามร่างกาย

คลำพวักท้อง
พบตับโต

อุจจาระสีซีด
บิสสาวะสีเข้ม



แนวทางการรักษา

การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี



การรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

การผ่าตัด

- การผ่าตัดเนื้องอก เป็นวิธีการรักษามาตรฐานที่ได้ผลดี และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้
- การผ่าตัดระยะบวมท่อน้ำดี ในผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ แต่ไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกออกได้ ควรได้รับการผ่าตัดระยะบวมท่อน้ำดี เพื่อรักษาอาการคันและส่วนเหลืองตาเหลือง

การส่องกล้อง

การส่องกล้องตรวจรักษาที่ท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกออกได้ หรือผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้

เคมีบำบัด/รังสีรักษา

เคมีบำบัด/รังสีรักษา ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกออกได้หมด หรือใช้ในการรักษาหลังผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสการหายขาด

โรคมะเร็งท่อน้ำดี มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการผ่าตัด หากพบในระยะเริ่มต้น

ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
โครงการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

บัญชี SCB เลขที่
111-393472-0

ติดต่อขอใบเสร็จรับเงิน : มูลนิธิสยามกัมมาจล เพื่อโครงการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี

E-mail : info@scbf.or.th โทรศัพท์ 02-937-9900

สอบถามโทร. 02-937-9901 ถึง 7

